

## Difusión de piezas informativas para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria

### RUTA DE MANEJO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑOS Y NIÑAS





## CUIDADOS Y RECOMENDACIONES POST VACÚNALES

- Quédate un tiempo para verificar que estás bien. El profesional sanitario debería observarte durante unos 15 minutos después de administrarte la vacuna por si sufres alguna reacción inmediata.

- Prepárate para posibles efectos secundarios. Las vacunas están diseñadas para proporcionarte inmunidad sin exponerte al peligro de contraer la enfermedad.

Estos son algunos efectos secundarios leves o moderados que podrías sentir después de recibir la vacuna:


- Dolor en el brazo, en la zona de la punción
- Fiebre leve
- Fatiga
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular o de las articulaciones
- Escalofríos
- Diarrea



Si alguno de los síntomas persiste durante más de unos días o si sufres una reacción más grave, ponte en contacto con tu profesional sanitario lo antes posible.

Ten paciencia. Crear inmunidad requiere tiempo. Se considerará que estás completamente vacunado una vez que hayan transcurrido dos semanas de la segunda dosis

Protégete y protege a los demás es importante seguir respetando las medidas de seguridad: evitar espacios muy concurridos, mantener la distancia física, lavarte las manos y llevar mascarilla.



<https://www.facebook.com/PICCacota/>